


# INTRANASALE APPLIKATION



## Durchführung

1. Höchstkonzentrierte Lösung, kleinstes Volumen des Medikaments wählen
2. Benötigtes Medikamentenvolumen auf 1ml-Spritze aufziehen
3. Zerstäuber an Spritzenkonus verbinden
4. Luft eliminieren und sicherstellen, dass die Spritze die gewünschte Dosis enthält
5. Nasenlöcher von Blut- und Schleimresten befreien
6. Mit der freien Hand den Hinterkopf des Patienten halten
7. Zerstäuber fest auf das Nasenloch aufsetzen
8. Ausrichtung Stempel nach oben und zur Seite
9. Spritzenstempel zügig vorschieben
10. max. 1ml pro Nasenloch Gesamtvolumen

**Cave:** Midazolam verursacht schmerzhafte Irritationen (Brennen) der Nasenschleimhaut.



## Dosierung Midazolam (Dormicum®)

Patient	Gewicht	Gesamtdosis	Menge je Nasenloch
<b>Kind</b>	Bis 10kg KG	<b>2,5mg = 0,5 ml</b>	<b>0,25 ml*</b>
<b>Kind</b>	10-20kg KG	<b>5mg = 1,0ml</b>	<b>0,5 ml</b>
<b>Kinder und Erwachsene</b>	>20kg KG	<b>10mg = 2,0ml</b>	<b>1,0 ml</b>

\*alternativ gemäß Kompendium:

Kinder <15kg: 1 Rectiole Diazepam  
 Kinder 15-20kg 2 Rectiole Diazepam

